



Dra. Lilian Aragão

CRM-52.81979-4

Ginecologista e Obstetra
Cirurgia Minimamente Invasiva e Uroginecologia
Histeroscopia

Documento de "Consentimento pós-informado" para Realização de

**Inserção de Implante Contraceptivo Subdérmico de Etonogestrel
(IMPLANON)**

Eu, _____,
declaro que a Dra. Lilian de Carvalho Aragão, CRM nº: 5281979-4 me
informou que tendo em vista o DESEJO DE CONTRACEPÇÃO COM
MÉTODO DE LONGA DURAÇÃO, ser indicado o uso de implante
contraceptivo subdérmico de etonogestrel.

Esclareceu-me que:

1. O Implante subdérmico de etonogestrel é um método contraceptivo.
2. O Implanon deve ser inserido sob a pele na face medial do braço, sob anestesia local.
3. O índice de falha, em 03 anos, é menor que 0,08.
4. Uma pequena quantidade de progestagênio etonogestrel (um tipo de hormônio feminino) é liberada continuamente, passando do implante para o corpo, resultando em um efeito anticoncepcional por um período de 03 anos.
5. Em alguns casos o procedimento de inserção e/ou retirada pode haver formação de cicatriz no local do implante.
6. A inserção ou remoção do implante pode causar irritação leve, dor e coceira no local. Pode ocorrer também hematoma no local da inserção.
7. O contraceptivo ser removido a qualquer momento, mas deve ser removido após o período de 03 anos de uso.
8. Como em todos os contraceptivos apenas com progesterona, Implanon pode mudar o padrão do sangramento vaginal. O padrão menstrual que poderá ocorrer com o uso do implante varia de mulher para mulher sendo de difícil previsão, mas em média, em 52% dos casos



Dra. Lilian Aragão

CRM-52.81979-4

Ginecologista e Obstetra
Cirurgia Minimamente Invasiva e Uroginecologia
Histeroscopia

ocorrem amenorreia (ausência de sangramento) ou sangramento infrequente, em 25% dos casos não ocorre alteração do fluxo menstrual (sangramento normal), em 16% ocorre um aumento no menstrual (sangramentos prolongados) e em 7% sangramentos frequentes.

9. Segundo os dados dos estudos realizados com Implanon, das mulheres que apresentavam acne, no momento da inserção, a maioria delas (cerca de 59%), teve melhora no quadro. Em cerca de 14% a acne ocorreu sem história prévia e 10% pioraram a condição anterior.

10. Em raros casos podem ocorrer alguns efeitos adversos tais como aumento de peso, cefaleia, dor nas mamas.

11. Algumas medicações podem interferir no perfeito funcionamento do implante como antiepiléticos e remédios para tratamento da tuberculose.

12. O Implante subdérmico de etonogestrel não previne contra infecção por HIV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível.

13. Fui orientada a manter uma atadura local nas primeiras 24 horas e a colocar compressa de gelo local pelo menos 05 vezes ao dia nas primeiras 24 horas.

14. Em caso de dor fui orientada a fazer uso de medicação analgésica.

15. Fui orientada a retornar à consulta de forma breve em caso de dor local intensa, hematoma extenso, febre, saída de secreção purulenta local ou quaisquer outras intercorrências.

16. Declaro ter recebido comprovante contendo data de inserção, data máxima de retirada e número do lote do produto.

17. Declaro estar ciente que os custos da inserção do implante, são apenas para o procedimento de inserção. Consultas subsequentes e a extração do implante serão cobradas a parte.

Entendi as explicações que foram prestadas em linguagem clara e simples, esclarecendo-me todas as dúvidas que me ocorreram. Também entendi que a qualquer momento prévio a inserção e sem

